

UPOZORNENIE :

Popis diagnózy je spracovaný na základe vysokoškolskej literatúry a nenahrádza odborné vysvetlenie diagnózy lekárom - špecialistom

I 80.2 Flebitída a tromboflebitída iných hlbokých ciev dolných končatín

latinsky : *plebitis et tromboplebitis*

Stručný popis choroby :

Ide o chorobné postihnutie žilového systému, ktoré zahŕňa súčasný priebeh dvoch od seba navzájom závislých procesov – trombózy a zápalu žilovej steny.

Na vzniku choroby sa zúčastňujú :

- poruchy hemokoagulácie
- poruchy cievnej steny
- reologické poruchy – spomalenie krvného prúdu

Medzi faktory, ktoré zvyšujú možnosť ochorenia zaraďujeme úrazy, operačné zákroky, intravenózne injekcie, invazívne vyšetrenie srdca, ale aj kardiálna dekompenzácia, nevládnosť, tehotenstvo a niektoré farmaká (napr. hormonálna antikoncepcia).

Ťažkosti pacienta :

Pacient je schvátený, máva teplotu vyše 38⁰C, maximum bolesti vníma na dolnej končatine. Noha je akoby cudzia a ťažká. Koža je nápadne bledá, opuch siaha od členkov až v slabine.

Komplikácie a prognóza :

Jednou z najčastejších komplikácií býva embolizácia do pľúc, ktorá môže prebiehať ako masívna pľúcna embólia s vývojom cor pulmonale acutum a môže byť príčinou náhlej smrti. Inou formou je opakovaná drobná embolizácia do pľúc, ktorá môže vyústiť do cor pulmonale chronicum. Tieto komplikácie veľmi zhoršujú prognózu pacientov.

Liečenie :

Základom liečby sú lieky s antikoagulačným účinkom, vhodná je aj fibrinolytická liečba so snahou rozpustiť trombus. Liečba sa musí zahájiť do 24 hodín od vzniku akútneho ochorenia.

Chirurgická liečba pozostáva z trombektómie katetrom, u pacientov s opakujúcimi sa embolizáciami je indikovaný chirurgický zákrok na dolnej dutej žile ako prevencia ďalších príhod.

Doporučenia po absolvovaní liečby :

Pacient má byť hospitalizovaný, po prepustení do domáceho liečenia ostáva práceneschopný niekoľko týždňov. V prípade sekcesívnej embolizácie treba uvažovať o invalidite.